

貓科尿道阻塞

甚麼是尿道阻塞？


貓貓（尤其是雄性貓貓）很容易有下尿道阻塞的問題。

獸醫會為您的貓貓插尿管，使尿道發炎的狀況慢慢減退。當發炎情況減退和貓貓回復正常時，獸醫會除去尿管。

但是，尿道阻塞是有可能復發的。

尿道阻塞出現的成因

- 壓力 - 貓貓尿道阻塞常見的成因
- 尿結石 - 不常見
- 膀胱感染 - 罕見



怎樣防止尿道阻塞復發？

- 獸醫可能會給貓貓一些止痛和肌肉鬆弛的藥物。
- 獸醫只會在確認貓貓有膀胱感染的情況下，給您的貓貓抗生素。
- 您的獸醫可能會建議貓貓食處方糧如 Hill's c/d 或 Royal Canin Urinary S/O
- **以下是一些為貓貓減壓的方法：**
 - 增加貓砂盆的數量，通常家中每隻貓貓應有屬於自己的貓砂盆，然後額外加一個貓砂盆
 - 避免突然換貓砂的牌子
 - 增加貓貓飲水的份量 - 使用飲水機、不同形狀和大小水兜、轉食罐頭濕糧
 - 鼓勵貓貓多玩耍，令居住的環境更適合貓貓 - 玩具、貓草、貓樹或把貓貓的床放在較高的位置
 - 使用Feliway香薰或噴霧 - Feliway 的費洛蒙有助減輕貓貓的壓力

主人應留意貓貓是否有以下的症狀：

- 排尿有困難
- 滴尿或沒有小便
- 小便帶大量血（通常在移除尿管的1-2日，小便仍可能會帶有少量血）

如果您不確定貓貓在12小時內是否有去小便或去小便有困難，請立刻與我們聯絡，因為這可能是危及生命的急症。