

# 癲癇

(俗稱「抽筋」)

癲癇發作的症狀



## 甚麼是癲癇？ 是什麼原因導致癲癇發作？

癲癇發作的原因通常是因為腦部釋放不正常的電流而引起。輕微的癲癇發作可以是抽搐或牙齒顫抖，嚴重的甚至乎會全身發抖，失去意識及失禁。

癲癇發作的原因有很多。在年幼的小動物中，最常見特發性癲癇，其原因至今尚不完全清楚。除了出現特發性癲癇外，這些動物基本上健康良好；而在較年長的動物中，不幸地腦癌通常是引起癲癇的常見原因。其他可能性包括器官衰竭、中毒或感染，例如腦膜炎等。獸醫可能會先建議一些基本測試。在某些情況下，有些寵物需要進行MRI掃描等的神經系統檢查。

## 癲癇要怎樣治療？

- 儘管大多數的癲癇是無法治愈的，許多患病的寵物可以透過藥物控制情況。
- 視乎癲癇發作的頻率，獸醫可能會建議患病的寵物開始使用抗癲癇的藥物。
- 抗癲癇的藥物最初可能會引起睡意，但這樣情況通常會慢慢減退。
- 雖然我們可能無法完全根治癲癇病，但藥物治療的目的是將癲癇發作的頻率降低至每六週少於一次。

## 如果我的寵物癲癇發作， 我應怎麼辦？

- 保持鎮定，確保寵物處於安全、不會跌倒的地方。
- 請勿將您的手在寵物口腔的附近 — 寵物可能會不由自主地咬人，在某些情況下無法放開口。舌頭阻塞至窒息的情況是極為罕見的。
- 如有獸醫處方的止抽筋藥（如Rectal Diazepam），主人可以盡快以塞肛的形式用藥。如果5分鐘後抽筋的情況未止，主人可以再用另一支止抽筋藥。
- 如果癲癇發作持續或複發不止一次，請立即與我們聯絡。
- 可以的話，主人可以拍攝的方法記錄抽筋的情況，好讓獸醫理解事發的過程。

## 為什麼我們要監測 寵物治療的進展？

新一代抗癲癇發作的藥物是非常安全的，但仍有某部分的藥物，而這些藥物可能會影響肝臟，所以我們建議定期檢查肝臟的功能，確保藥物的劑量不會太高或太低。視乎寵物的情況，您的獸醫會建議下一次覆診和驗血的時間。

creature comforts

VETERINARY GROUP